

+16

**Информированное согласие на
проведение добровольного
обследования **на антитела к ВИЧ****

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам профилактики
ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов**




47-03-35



срbsiz.khv@yandex.ru

+16



Пройди тест на ВИЧ

бесплатно

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ По вопросам

профилактики ВИЧ/СПИДа

и вирусных гепатитов

47-03-35



С какой **целью** проводится обследование на антитела к **ВИЧ** :

+16

- ✓ **Своевременное** установление диагноза ВИЧ-инфекции на основании обнаружения антител и данных последующих исследований ;
- ✓ Это позволяет **вовремя** начать **необходимое** лечение и принять другие меры к уменьшению **негативных последствий** заражения **ВИЧ**, предотвратить **передачу** ВИЧ близким людям.



Результаты обследования крови на антитела к ВИЧ могут быть :

+16

- ✓ **Положительными**
(антитела к ВИЧ обнаружены);
- ✓ **Отрицательными**
(антитела к ВИЧ не обнаружены);
- ✓ Результаты **"Негативные"** или неопределенными.





**ВИЧ-инфекция передается
только тремя путями:**

+16

- ✓ При **сексуальных контактах** без презерватива;
 - ✓ Через **кровь** при медицинских или немедицинских процедурах;
-
- ✓ От **инфицированной ВИЧ матери** к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ НЕ ПРОИСХОДИТ:

+16

- ✓ при бытовых контактах;
- ✓ при рукопожатиях;
- ✓ при пользовании общей посудой;
- ✓ при пользовании предметами быта;
- ✓ при пользовании бассейном;
- ✓ при пользовании туалетом, транспортом;
- ✓ при совместном приеме пищи;
- ✓ при укусах насекомых.





ВИЧ-инфекция - инфекционное хроническое заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),

+16

характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному

ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД).




**ВИЧ-инфекция передается
только тремя путями:**

+16

- ✓ При **сексуальных контактах** без презерватива;
 - ✓ Через **кровь** при медицинских или немедицинских процедурах;
-
- ✓ От **инфицированной ВИЧ матери** к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

crbsiz.khv@yandex.ru

+16



Пройди тест на ВИЧ

бесплатно

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ По вопросам

профилактики ВИЧ/СПИДа

и вирусных гепатитов

47-03-35



ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ НЕ ПРОИСХОДИТ:

+16

- ✓ при бытовых контактах;
- ✓ при рукопожатиях;
- ✓ при пользовании общей посудой;
- ✓ при пользовании предметами быта;
- ✓ при пользовании бассейном;
- ✓ при пользовании туалетом, транспортом;
- ✓ при совместном приеме пищи;
- ✓ при укусах насекомых.



Как избежать заражения ВИЧ:

+16

В течение жизни, в зависимости от личных обстоятельств и убеждений, человек может использовать разные способы предохранения:

- ✓ Например, иметь только одного верного, не инфицированного **ВИЧ** полового партнера;
- ✓ Не употреблять наркотики;
- ✓ Всегда пользоваться презервативами.



Как избежать заражения ВИЧ :

- ✓ Для предотвращения заражения через кровь необходимо **избегать** контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека;
- ✓ **ВИЧ-инфицированная** беременная женщина может защитить своего ребенка от заражения ВИЧ, принимая специальные лекарства во время беременности и отказавшись от грудного вскармливания.

+16



С какой **целью** проводится обследование на антитела к **ВИЧ** :

+16

- ✓ **Своевременное** установление диагноза ВИЧ-инфекции на основании обнаружения антител и данных последующих исследований;
- ✓ Это позволяет **вовремя** начать **необходимое лечение** и принять другие меры к уменьшению **негативных последствий** заражения **ВИЧ**, предотвратить **передачу** ВИЧ близким людям.



Консультирование перед проведением обследования на антитела к ВИЧ - это дотестовое консультирование.

+16

- ✓ **Дотестовое** консультирование на антитела к ВИЧ должно быть предоставлено всем желающим.
- ✓ Дотестовое консультирование проводится для того, чтобы человек перед обследованием мог обсудить **со специалистом** все аспекты этого **тестирования**, включая его возможные последствия.



Результаты обследования крови на антитела к ВИЧ могут быть :

+16

- ✓ **Положительными**
(антитела к ВИЧ обнаружены);
- ✓ **Отрицательными**
(антитела к ВИЧ не обнаружены);
- ✓ Результаты "**Негативные**" или неопределенными.



При обнаружении антител к ВИЧ человек, у которого они выявлены, считается

+16

"ВИЧ-положительным" или **"ВИЧ-позитивным"**

и от него может произойти заражение другого лица.



Обнаружение **антител к ВИЧ** накладывает на человека определенные обязательства по предупреждению возможного заражения других лиц.

В случае неопределенных результатов обследования человеку назначаются повторные обследования крови на антитела к **ВИЧ** или другие необходимые исследования.

Человек с **неопределенными результатами** обследования должен принимать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения других лиц.

+16



Если антитела к ВИЧ не обнаружены ,то , вероятно, человек **не инфицирован ВИЧ.**

+16

Однако существует период **серонегативного окна** - промежуток времени между заражением ВИЧ и появлением антител к ВИЧ, который обычно составляет **до 3 месяцев**, но может быть и дольше.

Поэтому, если имелся риск заражения ВИЧ в течение **менее 3 месяцев** до проведения обследования на ВИЧ, обследование рекомендуется повторить **через 3 и 6 месяцев.**



+16

**Информированное согласие на
проведение добровольного
обследования **на антитела к ВИЧ****

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам профилактики
ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов**



47-03-35



В случае обнаружения антител к ВИЧ **ВИЧ-позитивный** должен быть проинформирован о **результатах исследования**, ему будет подробно разъяснено значение результатов этого исследования .

+16



То есть, ему должно быть предоставлено подробное **послетестовое консультирование**.

+16

ВИЧ-позитивному должно быть предложено пройти дополнительные клиническое, лабораторное и эпидемиологическое обследования для установления **окончательного диагноза ВИЧ-инфекции**, стадии заболевания и назначения соответствующего лечения.

Необходимые исследования, связанные с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция и ее лечением, **для граждан Российской Федерации** осуществляются бесплатно.



Исследование на антитела к ВИЧ может проводиться анонимно или конфиденциально.

Анонимно - когда обследуемый не называет своего подлинного имени и результат может узнать по коду.

Конфиденциально - когда обследуемый сообщает медицинским работникам данные, которые позволяют его идентифицировать (**Ф.И.О., паспортные данные**), а медицинские работники берут на себя обязательство сохранять имя обследуемого в тайне, **независимо от результатов обследования.**

+16



Результаты тестирования на ВИЧ по телефону, электронной почте, путем СМС-информирования не сообщаются.

+16

Их сообщает специалист при консультировании после проведения обследования (послетестовом консультировании).



Послетестовое консультирование проводится после получения обследования на антитела к ВИЧ с целью разъяснения обследуемому его результатов и рекомендаций относительно дальнейшего образа жизни.

С какой **целью** проводится обследование на антитела к **ВИЧ** :

+16

- ✓ **Своевременное** установление диагноза ВИЧ-инфекции на основании обнаружения антител и данных последующих исследований;
- ✓ Это позволяет **вовремя** начать **необходимое лечение** и принять другие меры к уменьшению **негативных последствий** заражения **ВИЧ**, предотвратить **передачу** ВИЧ близким людям.

